

• •



.....	!	.
.....		5
-10.....		6
.....		6
.....		6
.....		6
.....		8
.....		11
.....		11
.....		11
.....		11
.....		11

- > 38° > 39°

3 3 36 ;
49 R50: 10- (-10)

- A49 –
- 49.9 –
- A49.8 –
- R50 –
- R50.0 –
- R50.1 –

[1,2,3,4]. 20%

3,2 29,2% (18%) [2].

3- 3- 22% 3-8% [5].

12 [6].

() 1/3

[7].

Streptococcus pneumoniae,
H. influenzae b, *N. meningitides*, *Salmonella spp.*, *S. typhi*
paratyphi.

1, 2, 6, 7 (ECHO),
 b 19, [7, 8]. 2- *E. coli*,
Klebsiella pneumoniae, *Streptococcus haemolyticus*, [8].
 20%

	:
	5-15 $10^9/$
	$< 1,5$
$10^9/$:
	10
	():
	< 5

3
3-6
3-6

:

$> 38^\circ$;

;

.

-
-
-
-
-
-

1.

2.

3.

).

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

, $10^{15} \cdot 10^9 /$, $10^{10} \cdot 10^9 /$, $> 1,5 \cdot 10^9 /$

11% [11]. 15-20%, $15 \cdot 10^9 / -$

15-17 $10^9 /$ [12].

() ()

[13].

24 2-6 25-35

48-72 [2,13]. 12

48

[14].

« » - (-) [15].

- $> 10 /$
- $> 15 \cdot 10^9 / /$
- $> 70 / /$
- $> 2 / ()$.

[8].

3 . ,

- > 50 ;

- (/);

- ;

- « », « » ;

- ;

- ;

- [1].

, , [1,9].

, 5% ,

, [9]. , 70% /

), .

> 2 / ,

.

- (: , >10 . .)

- (Rg- , ,)

- ()

- > 15 10⁹/ - ;

- < 5 10⁹/ - ,

- ;

- 10-15 10⁹/ : > 70 / - ;

- < 70 / - ;

- > 2 / - .

:

, 5-7 . ,

, :

- , - ;

- - (,

- , -).

- , ():

-

-

-

50 / [16].

[17],

90 / / : / (ATX: J01CR02)

50-100 / / (1). (ATX: J01DD04)

(: J01CA01) 2-

« »

12-24 (2). 48 -

/ (1).

[8].

1-2 % [7], 84%, - 69%

4- [16].

1. Baraff LJ. Management of infants and young children with fever without source // *Pediatr Ann.* 2008 Oct;37(10):673-9.

